

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, mengenai berat badan dan berat karkas ayam broiler yang diberikan pakan buatan berbeda dapat disimpulkan sebagai berikut. Dari keempat kelompok pakan buatan yang diberikan, kenaikan rata-rata berat badan ayam broiler paling optimal yaitu pada perlakuan P<sub>1</sub> yang mengalami kenaikan sebesar 1300 gram dari berat awal (W<sub>0</sub>) sampai berat akhir (W<sub>4</sub>). Dan peningkatan rata-rata berat karkas ayam broiler paling signifikan pada perlakuan P<sub>1</sub> yang mengalami kenaikan berat karkas sebesar 1280 gram. Berdasarkan uji Tukey dapat disimpulkan adanya pengaruh pemberian pakan buatan yang berbeda terhadap berat badan dan berat karkas ayam broiler baik pada berat badan maupun berat karkas.

#### B. Saran

Saran yang dapat dikemukakan berdasarkan penelitian ini adalah perlu dilakukan penelitian lanjutan yaitu dengan cara menggunakan hewan ternak lainnya. Pada penelitian ini dapat dilakukan pada ayam broiler usia *finisher* untuk mengetahui kesetabilan berat ayam broiler pada waktu di tempat penampungan.